

n

n^o. 663. agave maguay de cocuy (différent du maguay de cocuira ou ne mange pas les fautes ni boit la liqueur fermentée) cet agave diffère essentiellement du genre genre par la forme et longueur des étamines. Cal. o. cor. infund. 6-partita, laciniis lanceolato-ovatis ex albo viridibus, interioribus tribus latioribus. Stam. 6. corolla $\frac{1}{2}$ breviora, basi dilatata, medio incrassata ancipitia, apice subulata. germina triquetra (quali germina tria coacta) tricolata. Styl. 1. triquetra staminibus longior, petalis paulo brevior: stigma capitatum, sub tripartitum. Semicula 30-40. pedalis ramosa, ramis ~~trichobis~~ alternis, floribus pedunculatis alternis (sed tribus floribus ex uno centro nascentibus) caule tereti, folia cauli formica, lanceolata dentato pinnata, pinnis geminis cuneatis, altera dextrorsum, altera sinistrorsum reflexis. flores laxi pedunculi pallide lutei.



Furcraea
stam. non ex-
serta stigma
sub trilobum

Agave americana
stam. exserta
stigma trifid.
vel Ag. carib.
L. Jacq.

Le vrai maguay ou maguay de cocuira est foliis entiformibus strictis, erectis, junioribus integerrimis, nervibus adultioribus spinoso-dentatis, pinnis omnibus recurvatis simplicibus, floribus corymbosis, arcte aggregatis erectis, ex luteo fulvescentibus.

n^o. 3098. agave americana. (employé au Mexique pour faire le pulque.) Cal. o. Corolla 6-partita, laciniis lanceolato-lanceolatis, erectis, marginibus et præsertim basi membranaceis apice ciliatis. Stam. 6. corolla duplo longiora, antheræ versatiles oblongæ. ovarium oblongum ~~oblongum~~ oblongum triquetrum Styl. 1. staminibus paulo longior stigma subtrigonum. Capsula oblonga tripartita longa, triquetra, trilobulari polysperma.

